

LISA : Initiative Intercollèges

Exemple de la radiologie



- Spécialité transversale
- Collège en écriture pour peu de fiches

- Volonté d'améliorer le contenu des fiches LISA concernant l'imagerie
- Images
 - De bonne qualité, légendée
 - Plus faciles à comprendre et à mémoriser pour les étudiants
- Contenu adapté au programme et aux étudiants de 2^{ème} cycle

LISA : Initiative Intercollèges

Exemple de la radiologie



- Relecture des fiches LISA / basée sur le programme actuel
- Identification des fiches avec
 - Images de qualité sous optimale, non légendée ou manquante
 - Données d'imagerie allant au delà du programme
- 75 modifications demandées par message au collègue en écriture
 - 55 sur les images
 - 20 autres
- Si uniquement modification des images, changement fait en ligne par le CERF
- Reste quelques modifications de fond à faire

Connaître la sémiologie radiologique de la diverticulose et de ses complications OIC-287-09-B

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-287-09-B
Item parent	Diverticulose colique et diverticulite aiguë du sigmoïde
Rang	B
Intitulé	Connaître la sémiologie radiologique de la diverticulose et de ses complications
Description	
Rubrique	Examens complémentaires
Contributeurs	Frédérique PESCHAUD
Ordre	9

Les signes de diverticulite non compliquée au scanner sont :

- un épaissement de la paroi du côlon,
- une infiltration de la graisse autour d'un ou de plusieurs diverticules.

Les signes de complications sont :

- pour l'abcès : une collection liquidienne ou aérique et liquidienne, dont la taille doit être précisée,
- pour la péritonite : l'existence de bulles de pneumopéritoine (air extra-colique) et/ou de liquide et/ou de selles dans la cavité péritonéale,
- pour la fistule sigmoïdo-vésicale : l'existence de gaz dans les voies urinaires.

La **classification de Hinchey** permet d'évaluer la gravité de la diverticulite compliquée (clinico-radiologique) :

Stade I : phlegmon ou abcès péri-colique,

Stade II : abcès pelvien, abdominal ou rétropéritonéal (péritonite localisée),

Stade III : péritonite généralisée purulente,

Stade IV : péritonite fécale

TDM abdomino-pelvienne, coupes axiales, avec injection au temps portal (4 patients distincts)

Diverticule	Diverticulite sigmoïdienne	Diverticulite sigmoïdienne compliquée	
Image d'addition (de contenu variable aérique/matières/coprolithe)	Infiltration de la graisse Centrée sur un diverticule Épaississement de la paroi sigmoïdienne	Abscs : collection liquidienne ou hydro-aérique à parois épaisses (flèche verte) Perforation : pneumopéritoine (flèches rouges) / matières intrapéritonéales (flèche jaune)	

Classification de Hinchey
 Stade I : phlegmon ou abcès péri-colique,
 Stade II : abcès pelvien, abdominal ou rétropéritonéal (péritonite localisée),
 Stade III : péritonite généralisée purulente,
 Stade IV : péritonite fécale

Imagerie par scanner de la diverticulose et de ses complications. Image fournie par le CERF

Images à connaître pour le 2^{ème} cycle



https://cerf.radiologie.fr/sites/cerf.radiologie.fr/files/medias/Images%20%C3%A0%20conna%C3%AEtre%20pour%20EDN_2.pdf

